ICONES SELECTÆ PLANTARUM

Quas in Systemate universali, ex herbariis Parisiensibus, præsertim ex Lessertiano,

descripsit AUG. PYR. DE CANDOLLE,

Ex archetypis speciminibus

a P. J. F. TURPIN delineatæ

et

Editæ a BENJ. DE LESSERT

Academiæ Scientiarum socio honorario &c.

VOL. II.

Exhibens Ordines Berberideas, Nymphæaceas, Papaveraceas, Fumariaceas et Cruciferas.

Parisiis.
1823.

INDEX SPECIERUM.

BERBERIDEÆ.

BERBERIS ASIATICA. Tab. I.

BERBERIS ASIATICA. ROXB. *Ined. D. C. Syst.* 2. *p.* 13.

B. SPINIS trifidis, simplicibusve, foliis ovalibus, mucronatis, integris aut spinoso-dentatis, racemis brevibus multifloris, pedicellis elongatis, baccis subglobosis. *D. C. l. c.*

CRESCIT in India orientali (Roxb.) in Napauliâ (Wallich) ♄.

EXPLIC. ICON. I. — 1. Flos nondùm apertus auctus. — 2. *Idem* apertus. — 3. Calyx et pistillus corollâ avulsâ. — 4. Calycis sepalum exterius. — 5. Calycis sepalum interius. — 6-7. Petala. — 8. Stamen.

BERBERIS TINCTORIA. Tab. II.

B. TINCTORIA. LESCHEN. *Mem. Mus.* 9. *p.* 306. *D. C. Syst.* 2. *p.* 713 *in add.*

Frutex 20 pedes altus. Caulis lignosus, teres, ramosus, cortice rimoso lutescente, sapore valdè amaro; ligno compacto luteo; ramulis glabris, virgatis, subangulatis, aculeatis.

Aculei stipulares profundè tripartiti, partitionibus rigidis, pungentibus.

Folia fasciculata, coriacea, glaberrima, subtùs glauca, obovalia, apice spinoso-mucronata, integerrima, rariùs denticulato-spinosa, denticulis raris, sparsis.

Flores in axillis foliorum racemosi, racemo simplici, pedunculato, floribus sat longè pedicellatis.

Fructus : baccæ obovoïdeæ, apice incrassatæ, stylo stigmateque apiculatæ, glaberrimæ, glaucæ, uniloculares, dispermæ. Semina ovoïdeo-oblonga, subcompressa, erecta; integumentum crustaceum; embryo orthiotropus, erectus, in endospermio subcorneo inclusus.

CRESCIT in montibus Nelly-Gerry Indiæ orientalis, ubi *Tjakalou* vernaculè dicitur. E ligno corticeque elicitur color luteus, cæteris præstantior. (Vidi specimina fructifera in Herbario Musæi Parisini servata, et à clar. *Leschenault* ex Indiâ orientali allata.) ♄.!

Hæc species, quam primus recenter sub nomine *Berberidis tinctoriæ* indicavit indefessus peregrinator LESCHENAULT DE LA TOUR (*Mémoires du*

Muséum. 9. *p.* 306.), nullo modo à *Berberide asiaticâ* Roxb. (*confer.* De Cand. *Syst. nat.* 2. *p.* 13. Delessert, *Icones selectæ.* 2. *t.* 1.) differre nobis videtur, et cum illâ unam eamdemque speciem constituit, ut facillimè intelligent qui descriptiones et icones harum stirpium quas hic præbemus, comparabunt. In stirpe Leschenaultianâ, folia subminora, minus spinoso-dentata varietatem vix notabilem constituunt. Itaque *Berberidem tinctoriam* Lesch. cum *Berberide asiatica* Roxburg conjungi et hocce nomen uti pristinum retinere debet.

Explic. icon. II. — 1. Bacca integra. — 2. Eadem longitudinali sectione aperta. — 3. Semen integrum. — 4. Id. longitudinaliter sectum. — 5. Embryo.

MAHONIA FASCICULARIS. Tab. III.

Mahonia fascicularis. D. C. *Syst.* 2. *p.* 19.

M. foliis 4-5 jugis cum impari, jugo inferiore ad basin petioli approximato, foliolis ovato-lanceolatis repando-dentatis, dentibus utrinque 4-5, racemis erectis confertissimis. *D. C. l. c.*

Crescit in Americæ borealis orâ occidentali circa Monterei et Nutka (Née ex Lagasca) in Novâ-Hispaniâ prope Moran (Humb. et Bonpl.).

Explic. icon. III. — 1. Flos auctus. — 2. 3. 4. 5. Variæ petalorum figuræ. — 6. Pistillus. — 7. Id. longitudinaliter sectus. — 8. Stamen cum petalo. — 9. Fructus. — 10. Id. longitudinaliter sectus. — 11. Id. transversim sectus. — 12. Semen auctum. — 13. Id. longitudinaliter sectum. — 14. Embryo denudatus.

MAHONIA NAPAULENSIS. Tab. IV.

Mahonia napaulensis. D. C. *Syst.* 2. *p.* 21.

M. foliis 6-jugis cum impari, jugo inferiore minore ad petioli basin approximato, foliolis ovato-lanceolatis, basi 5-nerviis, repando-dentatis, dentibus utrinque 5-10, racemis paucis, elongatis, gracilibus. *D. C. l. c.*

Crescit in Napauliâ circà *Harain-Netty* (Buch. Roxb.) ♄.

Explic. icon. IV. — 1. Flos inapertus auctus. — 2. Id. apertus. — 3-4. Sepala. — 5. Calyx cum pistillo. — 6-7. Petala. — 8. Stamen antherâ dehiscente.

NYMPHÆACEÆ.

NYMPHÆA RENIFORMIS. Tab. V.

N. reniformis. Walt. *fl. carol.* 155.

N. Foliis reniformibus, stigmate 16-radiato. *D. C. Syst.* 2. *p.* 55.

Crescit in Carolinâ (Fraser) ♃.

Explicatio iconis V. — 1. Pedunculus auctus transversim sectus. — 2. Pistillus. — 3. Petalum interiùs apice vestigia antheræ gerens.

NUPHAR JAPONICA. Tab. VI.

N. calice 5-petalo, stigmate 15-16 radiato, foliis oblongo-sagittatis, cordatis, auriculis acutis subdistantibus, petiolis teretiusculis. *D. C. Syst.* 2. *p.* 62. Nymphæa lutea. Thunb. *fl. Jap.* 223. *excl. syn.*

Crescit hinc indè in aquis Japoniæ. (Thunb.) ♃.

Explic. icon. VI. — 1. Pistillus. — 2. Petalum. — 3. Stamen.

PAPAVERACEÆ.

PAPAVER SETIGERUM. Tab. VII.

Papaver setigerum. D. C. *Flor. fr. Suppl. p.* 585.

P. Capsulis glabris obovatis, sepalis subsetosis, caule glabro-paucifloro, foliis amplexicaulibus glaucis inciso-repandis, dentibus setâ terminatis, *D. C. Syst.* 2. *p.* 81.

Crescit in insulis Stœchadum (Requien) ⊙.

Explic. icon. VII. — 1. Capsula transversim secta.

RŒMERIA REFRACTA. Tab. VIII.

R. siliquis 3-4 valvibus glabris, pedicello demùm recurvo pendulis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 93.

Crescit in Tauriâ circâ *Derbent* (Steven) ⊙.

Explic. icon. VIII. — 1. Genitalia aucta, calyce corollâque avulsis. — 2. Petalum intùs visum. — 3. Stamen auctum.

FUMARIACEÆ.

DICLYTRA TENUIFOLIA. Tab. IX. f. B.

D. Calcaribus 2 brevissimis obtusissimis, scapo nudo 1-3-floro, pedicellis calyce brevioribus, foliis multifidis, lobulis linearibus. *D. C. Syst.* 2. *p.* 110.

Corydalis tenuifolia. Pursh. *Fl. bor. Am.* 2. *p.* 462.

Crescit in Kamtschatka (Pallas) ♃.

Explic. icon. IX. f. B. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx cùm genitalibus.

CORYDALIS PAUCIFLORA. Tab. IX. f. A.

C. pauciflora Pers. *Ench.* 2. *p.* 269.

C. caule simplici exsquammato, foliis caulinis 2-3 infrà medium biternatim sectis, segmentis tripartitis, lobis obovatis, bracteis ovatis acutis, racemo conferto paucifloro. *D. C. Syst.* 2. *p.* 115.

Crescit in montibus Altaïcis Sibiriæ (Stephan. Patrin) ♃.

Explic. icon. IX. f. A. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx cùm genitalibus.

CORYDALIS MARSCHALLIANA. Tab. X.

C. marschalliana. Pers. *Ench.* 2. *p.* 269.

C. caule simplici exsquammato, foliis 2 suprà sitis biternatim sectis, lobis ovalibus integris, racemo brevi, bracteis ovalibus. *D. C. Syst.* 2. *p.* 116.

Crescit in Tauriæ et promontorii Caucasici necnon in Uchraniæ montibus sylvaticis sub arboribus (Bieberstein) ♃.

Explic. icon. X. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia cum petalis duobus interioribus. — 3. Fructus. — 4. Id. dehiscens. — 5. Semen auctum.

CRUCIFERÆ.

MATHIOLA OXYCERAS. Tab. XI.

M. Caule erecto ramoso glanduloso, foliis velutinis sinuato-repandis, superioribus integris, siliquis teretibus subvelutinis glandulosisque, tricuspidatis, cuspidibus lateralibus subreflexis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 173.

Crescit in arenosis desertis circà Damascum (Labillardière) ⊙.

Explicatio iconis XI. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4. Siliqua, valvis avulsis. — 5. Semen naturali magnitudine. — 6. Id. auctum. — 7. Id. transversim sectum. — 8. Embryo denudatus.

MATHIOLA LIVIDA. Tab. XII.

M. caule subdiffuso ramosissimo, foliis oblongo-linearibus, infimis sinuatis, tomento velutino glandulis interspersis, siliquis teretiusculis pubescentibus glandulosisque tricuspidatis, cuspidibus adscendentibus stigmate longioribus. *D. C. Syst.* 2. *p.* 174.

Cheiranthus lividus Delile. *Ill. Fl. æg. p.* 19. *n.* 691.

Crescit in Ægypti desertis propè *Cahiram* ad pagum *Caid-Rey* (Delile) ⊙.

Explic. icon. XII. — 1. Folium auctum. — 2. Flos auctus. — 3. Genitalia. — 4. Petalum. — 5. Stamen. — 6. Stigma. — 7. Siliqua. — 8. Eadem dehiscens. — 9. Semen auctum.

CHEÏRANTHUS LEPTOPHYLLUS. Tab. XIII.

C. leptophyllus Marsh. Bieb. *Fl. taur.* 2. *p.* 119.

C. foliis omnibus lineari-lanceolatis integerrimis incanis scabris, caule ramoso, siliquisque teretibus incanis patulis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 182.

Erysimum leptophyllum. *D. C. Prodr. Syst. univ.* 1. *p.* 198 (1).

Crescit in collibus siccis Iberiæ (Steven) in subumbrosis, herbidis, sylvaticis, montanis, propè flumen Aragwi (Fischer) ⊙.

Explic. icon. XIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx cum genitalibus. — 3. Petalum. — 4. Genitalia. — 5. Folii fragmentum. — 6. Pilus malpighiaceus. — 7. Pilus radiatus.

---

(1) Ex D. C. Prodr. vol. 1. p. 198. *Cheiranthus collinus, C. leptophyllus et C. versicolor* ad Erysimum genus transferri debent, ut jam in Syst. nat. suspicatus est auctor.

NASTURTIUM GLAUCOPHYLLUM. Tab. XIV.

N. glaberrimum, foliis radicalibus petiolatis obovato-orbiculatis crenatis coriaceis, summis linearibus squammiformibus. *D. C. l. c. p.* 195.

Crescit in Persiâ propè Teheram (Olivier) ♃.

Explic. icon. XIV. — 1. Siliqua.

NASTURTIUM NATANS. Tab. XV.

N. foliis emersis oblongo-linearibus integris, immersis multifido-capillaceis, petalis calyce vix longioribus, siliculis obovato-globosis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 198.

Crescit in aquis stagnantibus subsalsis ad flumen Alëi in tractu Kolyvanensi Sibiriæ (Patrin) ♃.

Explic. icon. XV. — 1. Flos auctus. — 2. Petalum. — 3. Pistillus. — 4. Id. cùm staminibus.

NOTOCERAS QUADRICORNE. Tab. XVI.

Erysimum quadricorne Steph. *in* Willd. *Sp.* 3. *p.* 514.

N. Siliquis quadricornibus, foliis sinuato-dentatis, pube molli ramosâ. *D. C. l. c.* 2. *p.* 204.

Crescit in Sibiriâ inter Volgham et Kumam fluvium (Stephan) ☉.

Explic. icon. XVI. — 1. Flos auctus, — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4-5. Stamina. — 6. Pilus radiatus. — 7. Siliqua. — 8. Apex siliquæ.

NOTOCERAS HISPANICUM. Tab. XVII.

Diceratium prostratum Lagasca *en. hort. mad.* 1815, *p.* 20.

N. siliquis bicornibus, petalis inæqualibus, foliis integris, pilis strigosis centro adfixis bipartitis confertissimis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 204.

Crescit in locis ruderatis Hispaniæ (Lagasca) ☉.

Explic. icon. XVII. — 1. Pilus. — 2. Folium. — 3. Flos. — 4. Genitalia. — 5. Stamen. — 6. Petalum. — 7. Silicula. — 8. Silicula dehiscens. — 9. Eadem transversim secta. — 10. Semen. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus. — (Figuræ omnes sunt auctæ).

NOTOCERAS CARDAMINEFOLIUM. Tab. XVIII.

Lepidium cornutum Sibth. *Fl. græc. t.* 617.

N. siliquis bicornibus, foliis pinnatisectis, glabris. *D. C. l. c.* 2. *p.* 205.

Crescit in Ponto (Tournef.), in agris ad Bosphorum, in insulâ Cypro (Sibth, ⊙.

Explic. icon. XVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx. — 3. Petalum. — 4. Stamen. — 5. Pistillus. — 6. Siliqua. — 7. Eadem dehiscens. — 8. Sectio transversalis siliquæ. — 9. Semen auctum.

BARBAREA PLANTAGINEA. Tab. XIX.

B. foliis inferioribus dentato-lyratis, lobis lateralibus dentiformibus, terminali maximo subcordato, superioribus ovatis, siliquis subincurvis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 208.

Crescit in Oriente (Tournef. Burm.) ♃.

Explic. icon. XIX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Calyx cum pistillo. — 4. Petalum. — 5. Stamen auctum.

STEVENIA ALYSSOIDES. Tab. XX.

S. alyssoïdes Ad. et Fisch. *Mem. Soc. nat. mosc.* 5. *p.* 84.

S. caule subadscendente, ramosissimo, siliquis pedicello brevioribus. *D. C. l. c.* 2, *p.* 209.

Crescit in montibus Sibiriæ Werchojanensibus (Adams) ⊙.

Explic. icon. XX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia cum calyce. — 3. Genitalia. — 4. Petalum. — 5-6. Stamina. — 7. Pilus radiatus. — 8. Siliqua. — 9. Eadem dehiscens. — 10. Semen naturali magnitudine. — 11. Id. auctum. — 12. Id. transversim sectum. — 13. Embryo denudatus.

STEVENIA CHEIRANTHOIDES. Tab. XXI.

S. caule strictè erecto simplici aut parcè ramoso, siliquis pedicello longioribus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 210.

Crescit in Sibiria ♃.

Explic. icon. XXI. — 1. Flos auctus. — 3. Calyx cum pistillo. — 3. Genitalia. — 4. Petalum. — 5. Folium auctum. — 6. Pilus radiatus auctus.

BRAYA ALPINA. Tab. XXII.

B. Alpina. Sternb et Hop. *D. C. l. c.* 2. *p.* 211.

Crescit in Alpibus Carinthiæ superioris (Stern et Hop.), et Salisburg (Jacq.) ♃.

Explic. icon. XXII. — 1. Folium. — 2. Flos auctus. — 3. Calyx. — 4. Petalum. — 5. Genitalia. — 6-7. Stamina. — 8. Siliqua naturali magnitudine. — 9-10. Eadem aucta. — 11. Semen auctum.

ARABIS ROSEA. Tab. XXIII.

A. foliis caulinis oblongis, semi-amplexicaulibus, subcordatis dentatis, pube ramosâ scabris, pedicellis calyce longioribus, stigmate apiculato. *D. C. l. c.* 2. *p.* 215.

Crescit in Calabriâ circà *Cosenzam* (Thomas).

Explic. icon. XXIII. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia calyce cincta. — 3. Petalum. — 4. Genitalia. — 5. Siliqua.

ARABIS BILLARDIERII. Tab. XXIV.

A. foliis pauci-dentatis, pube ramosâ, cano-villosis, subtomentosis, inferioribus obovatis, cuneatis, summo oblongo amplexicauli, pedicellis calyce longioribus, siliquis demùm patulis *D. C. l. c.* 2. *p.* 218.

Crescit in Syriâ prope Damascum in monte *Dgebel-cher* dicto (Labillardière) ♃.

Explic. icon. XXIV. — 1. Flos auctus. — 2. Petalum. — 3. Genitalia. — 4. Siliqua dehiscens. — 5. Semen auctum. — 6. Id. transversim sectum. — 7. Embryo denudatus. — 8-9. Pili radiati.

ARABIS LONGIFOLIA. Tab. XXV.

A. foliis dentatis, pube ramosâ, cano-pubescentibus, inferioribus obovato-oblongis, longissimè petiolatis, caulinis oblongis, subamplexicaulibus, pedicellis calyce longioribus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 219.

Crescit in Persiâ (Michaux).

Explic. icon. XXV. — 1. Calyx auctus cum pistillo. — 2. Genitalia aucta. — 3. Petalum. — 4. Stamen anticè visum. — 5. Stamen posticè visum. — 6. Stamen lateraliter visum.

ARABIS CEBENNENSIS. Tab. XXVI.

A. foliis omnibus petiolatis, ovatis, acuminatis, grossè dentatis, pube minimâ subvelutinis, pedicellis siliquisque patulis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 234.

Crescit in locis subumbrosis montium Cebennorum. ♃.

Explic. icon. XXVI. — 1. Flos unicus magnitudine naturali. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx. — 4. Petalum. — 5. Stamen auctum. — 6. Semen magnitudine naturali. — 7. Semen auctum. — 8. Semen auctum transversim sectum. — 9. Embryo auctus.

ARABIS PATRINIANA. Tab. XXVII.

A. foliis oblongis acuminatis sub-serratis cordato-amplexicaulibus villosis, caule tereti hispido, pedicellis calyce triplò longioribus, siliquis pendulis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 236.

Crescit in Sibiria ad Uram propè *Chamanaikha* (Patrin) ♃.

Explic. icon. XXVII. — 1. Flos auctus. — 2. Petalum. — 3. Genitalia. — 4. Calyx. — 5. Stamen auctum.

ARABIS CANADENSIS. Tab. XXVIII.

A. canadensis. *L. sp.* 929.

A. foliis caulinis sessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis subdentatis, pedicellis calyce triplò longioribus, siliquis pendulis subfalcatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 238.

Crescit in rupibus umbrosis Americæ septentrionalis, à Canadâ ad Virginiam ♃.

Explic. icon. XXVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus. — 3. Petalum. — 4. Stamen. — 5. Genitalia. — 6. Semen auctum. — 7. Id. transversim sectum. — 8. Embryo denudatus auctus.

CARDAMINE TUBEROSA. Tab. XXIX.

C. foliis glabris radicalibus longè petiolatis reniformibus, caulinis pinnatim trisectis, radice tuberosa. *D. C. l. c.* 2. *p.* 254.

Crescit in Chili (Dombey) ♃.

Explic. icon. XXIX. — 1. Genitalia. — 2. Calyx cum pistillo. — 3. Petalum. — 4. Stamen auctum intùs visum. — 5. Id. externâ facie.

CARDAMINE HEDERACEA. Tab. XXX. f. A.

C. foliis petiolatis glabris pinnatisectis, segmentis 5 petiolulatis latè ovatis obtusè trilobis, siliquis erectis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 264.

Crescit in Syriâ (Labillardière) ♃.

Explic. icon. XXX. f. A. — 1. Flos auctus. — 2. Petalum. — 3. Fructus.

CARDAMINE PETIOLARIS. Tab. XXX. f. B.

C. foliis longè petiolatis glabris pinnatisectis, segmentis 9-10 petiolulatis ovatis dentatis sublobatis, siliquis erectis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 264.

Crescit ad Caucasum septentrionalem prope Mosdock (Goldbach).

Explic. icon. XXX. f. B. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx. — Petalum. — 6. Fructus.

CARDAMINE GLAUCA. Tab. XXXI.

C. glauca. Sprengel in Litt.

C. foliis petiolatis glabris glaucis subcarnosis pinnatisectis, segmentis 3-9 oblongis, terminali 3-lobo, caule diffuso ramosissimo, siliquis erectis glabris. *D. C. l. c. 2. p.* 266.

Crescit in aspero monte prope Reggio in Calabria (L. Thomas) ♃.

Explic. icon. XXXI. — 1. Flos separatus. — 2. Calyx auctus cum genitalibus. — 3. Petalum. — 4. Germen cum glandulis basilaribus. — 5. Stamen intus visum. — 6. Stamen extus visum. — 7. Siliqua non aperta. — 8. Eadem aperta, dissepimento seminibusque patentibus. — 9. Semen auctum. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo denudatus.

CARDAMINE MARITIMA. Tab. XXXII.

C. foliis petiolatis glabris glaucis pinnatisectis, segmentis 5-7 ovato-cuneatis repandis, caule diffuso ramosissimo, siliquis erectis glabris. *D. C. l. c. 2. p.* 266.

Crescit in Dalmatiæ peninsulâ Sobioncello, ad littora maris ⊙.

Explic. icon. XXXII. — 1. Folium auctum. — 2. Flos auctus. — 3. Calyx. — 4. Genitalia. — 5. Petalum. — 6. Siliqua. — 7. Siliqua dehiscens. — 8. Semen naturali magnitudine. — 9. Id. auctum. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo denudatus.

DENTARIA QUINQUEFOLIA. Tab. XXXIII.

D. quinquefolia. Marsh.-Bieb. *Fl. cauc.* 2. *p.* 109.

D. foliis caulinis 3 alternis verticillatisve pinnatisectis, segmentis 5-7 oblongo-linearibus grosso dentatis, terminalibus non confluentibus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 277.

Crescit sub arboribus in sylvis Tauriæ et Caucasi, et ad Ukraniam. (Marsh.-Bieb.) ♃.

Explic. icon. XXXIII. — 1. Plantæ rhizoma. — 2. Calyx. — 3. Genitalia aucta. — 4. Petalum auctum. — 5. Stamen id.

FARSETIA ERIOCARPA. Tab. XXXIV.

F. caulibus erectis basi suffruticulosis, foliis oblongis, siliculis dense sericeo-lanatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 288.

Crescit in insulâ Cypro (Labillardière) ♄.

Explic. icon. XXXIV. — 1. Pilus auctus. — 2. Flos. — 3. Calyx cum pistillo. — 4. Genitalia. — 5. Stamen. — 6. Petalum. — 7. Semen. — 8. Id. transversim sectum. — 9. Embryo denudatus.

VESICARIA VESTITA. Tab. XXXV.

V. vestita. Desv. *Journ. bot.* 3. *p.* 171 *et* 183.

V. calyce persistente, foliis linearibus acutis tomentosis integris. *D. C. l. c.* 2. *p.* 299.

Crescit in Persiâ (Mich.) ♄.

Explic. icon. XXXV. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Stamen auctum. — 4. Petalum. — 5. Calyx auctus cùm pistillo, petalis staminibusque avulsis. — 6. Silicula dorso visa. — 7. Silicula suturâ laterali visa. — 8. Pilus stellatus auctus.

SCHIVERECKIA PODOLICA. Tab. XXXVI.

Schivereckia Podolica. *Andr. et Bess. in litt. D. C. l. c.* 2. *p.* 300.

Crescit in Podoliâ (Bess.), in Wolhyniâ (Ster.); in Sibiriâ ♃.

Explic. icon. XXXVI. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus, flore avulso. — 3. Genitalia aucta. — 4. Petalum. — 5. Stamen auctum, filamento appendiculato. — 6. Silicula dorso visa. — 7. Eadem suturâ laterali visa. — 8. Eadem aperta, valvis infernè dehiscentibus. — 9. Eadem aperta, valvis ablatis, dissepimento seminibusque patentibus. — 10. Semen auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus.

ALYSSUM SPATHULATUM. Tab. XXXVII.

A. spathulatum Steph. in Willd. *Sp.* 3. *p.* 465.

A. caulibus basi suffruticulosis, foliis spathulato-obovatis, petiolis cano-velutinis, siliculis orbiculatis stylo paulò longioribus, seminibus marginatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 304.

Crescit in montibus Sibiriæ Altaïcæ (Fischer), in Sibiriâ orientali hyperboreâ (Adams) ♄.

Explic. icon. XXXVII. — 1 Folium auctum. — 2. Folii frustulum auctum pilis stellatis.

onustum. — 3. Flos auctus. — 4. Genitalia aucta. — 5. Calyx auctus cum pistillo. — 6. Petalum auctum. — 7. Stamen auctum intùs visum. — 8. Id. extùs visum. — 9. Silicula aucta dorso visa, stylo superata. — 10. Eadem valvis ablatis, dissepimento semineque unico superstite patentibus. — 11. Semen auctum.

ALYSSUM OBTUSIFOLIUM. Tab. XXXVIII.

A. OBTUSIFOLIUM. STEVEN. *Ined.*

A. caulibus basi suffruticulosis pube stellatâ pubescentibus, foliis obovato-spathulatis obtusis, subtùs argenteis, siliculis ovato-orbiculatis subvelutinis, seminibus immarginatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 306.

CRESCIT in Tauriâ meridionali et in Sibiriâ (Steven) ♃.

EXPLIC. ICON. XXXVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx absque corollâ. — 3. Petalum auctum. — 4. Genitalia aucta. — 5. Stamen auctum intùs visum, filamento appendiculato. — 6. Stamen auctum extùs visum, absque filamenti parte inferiore. — 7. Germen auctum. — 8. Silicula aucta non aperta dorso visa. — 9. Eadem aperta, dissepimento seminibus valvisque pilis stellatis onustis patentibus. — 10. Semen auctum. — 1 bis. Folium inferius caulinarium pilis stellatis onustum. — 2 bis. Folium superius caulinarium. — 3 bis. Pilus stellatus auctus.

ALYSSUM MICROPETALUM. Tab. XXXIX.

A. MICROPETALUM. FISCHER. *Ined.*

A. caule herbaceo erecto, foliis lanceolatis, siliculisque hirsutis orbiculatis stylo duplò longioribus longè racemosis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 313.

CRESCIT in Iberiâ Mediâ (Bieb), propè Tiflim (Fischer) ⊙.

EXPLIC. ICON. XXXIX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Petalum auctum. — 4. Stamen auctum, filamento appendiculato denticulato. — 5. Silicula aucta, pilis radiatis vestita. — 6. Eadem, valvis seminibus dissepimentoque segregatis. — 7. Folium auctum, pilis stellatis onustum.

ALYSSUM HIRSUTUM. Tab. XL.

A. HIRSUTUM. BIEB. *Fl. cauc.* 2. *p.* 106.

A. caule herbaceo erecto, foliis lanceolatis hirsutis, siliculis orbiculatis tuberculato-hirsutis longè racemosis stylo triplò longioribus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 314.

CRESCIT in Tauriæ et Iberiæ campis apricis (Bieb) ⊙.

EXPLIC. ICON. XL. — 1. Flos auctus. — 2. Id. absque corollâ. — 3. Genitalia aucta. —

4. Petalum. — 5. Stamen intus visum. — 6. Id. extus visum. — 7. Germen hirsutissimum. — 8. Silicula aucta dorso visa. — 9. Eadem aperta, valvis dissepimentoque segregatis. — 10. Semen magnitudine naturali. — 11. Id. auctum. — 12. Pilus malpighiaceus. — 13. Pilus stellatus auctus.

ALYSSUM MACROCARPUM. Tab. XLI.

A. caule fruticoso ramoso subspinescente, foliis oblongis obtusis argenteis, siliculis obovato-orbiculatis subemarginatis glabris stylo apiculatis 8-ovulatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 321.

Crescit in Cebennis et Pyrenæis orientalibus ♄.

Explic. icon. XLI. — 1. Folii frustulum stellato-pilosum. — 2. Flos separatus. — 3. Calyx auctus cum pistillo. — 4. Petalum. — 5. Genitalia aucta. — 6. Stamen intus visum. — 7. Id. extus visum. — 8. Pilus stellatus auctus. — 9. Silicula aucta. — 10. Eadem aperta. — 11. Semen magnitudine naturali. — 12. Id. auctum.

MENIOCUS LINIFOLIUS. Tab. XLII.

M. serpyllifolius. Desv. *Journ.* 3, *p.* 175.

M. linifolius. *D. C. l. c.* 2. *p.* 325.

Crescit in ruderatis et cultis circà Astracan (Fischer), in Tauriâ, Caucaso (Bieb), in Syriâ (Russel) inter Alep et Mossul (Olivier), in Podoliâ, Illyriâ, etc. ⊙.

Explic. icon. XLII — 1. Folium stellato-pilosum. — 2. Pilus stellatus auctus. — 3. Flos auctus non apertus. — 4. Germen auctum. — 5. Genitalia aucta. — 6. Stamen auctum, filamento appendiculato. — 7. Silicula aucta. — 8. Eadem aperta. — 9. Semen magnitudine naturali. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus.

PELTARIA GLASTIFOLIA. Tab. XLIII.

P. foliis caulinis sagittato-amplexicaulibus, siliculis planiusculis rugulosis coriaceis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 330.

Crescit in Oriente inter Alep et Mossul. (Olivier) ⊙.

Explic. icon. XLIII. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Calyx. — 4. Petalum. — 5. Stamen. — 6. Silicula. — 7. Eadem dehiscens. — 8. Eadem transversim secta.

DRABA INCOMPTA. Tab. XLIV.

D. incompta. Steven *in* Bieb. *Fl. cauc. Suppl. p.* 427.

D. scapis velutinis foliis triplò longioribus, foliis oblongis pube stellatâ cano-velutinis, pedicellis flore brevioribus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 340.

Crescit in Caucasi orientalis Alpe Tyfendagh ♃.

Explic. icon. XLIV. — 1. Folium auctum piloso-stellatum. — 2. Flos auctus. — 3. Genitalia aucta. — 4. Calyx auctus cum pistillo. — 5. Petalum auctum. — 6. Silicula aucta.

DRABA MOLLISSIMA. Tab. XLV.

D. MOLLISSIMA. STEVEN in BIEB. *Fl. caus. Suppl. p.* 426.

D. scapis nudis glabris foliis multò longioribus, foliis oblongis pube stellatâ cano-velutinis, pedicellis flore longioribus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 547.

Crescit in Caucasi orientalis Alpe Schadag. (Steven) ♃.

Explic. icon. XLV. — 1. Folium auctum piloso-stellatum. — 2. Flos auctus. — 3. Calyx auctus cum pistillo. — 4. Genitalia aucta. — 5. Petalum auctum. — 6. Stamen auctum intùs visum. — 7. Id. extùs visum.

DRABA LÆVIPES. Tab. XLVI. f. A.

D. scapis nudis monophyllisve pubescentibus, foliis ovatis pube stellatâ brevi tomentosis, siliculis elongato-linearibus pedicellisque glaberrimis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 346.

Crescit in rupibus Pyrenæorum centralium editorum ♃.

Explic. icon. XLVI. f. A. — 1. Pilus stellatus stipitatus.

DRABA STELLATA. Tab. XLVI. f. B.

D. STELLATA. JACQ. *H. Vindob.* 113. *Obs. n.* 54. *t.* 4. *f.* 3.

D. scapis monophyllis pubescentibus, foliis ovali-oblongis, pube stellatâ brevi tomentosis, pedicellis puberulis, siliquis oblongis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 346.

Crescit in fissuris rupium locis editissimis apricis Pyrenæorum, Alpium Gallo-provinciæ, Helvetiæ, Delphinatùs, etc. ♃.

Explic. icon. XLVI. Fig. B. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus cum pistillo. — 3. Genitalia aucta. — 4. Petalum auctum. — 5. Stamen auctum. — 6. Fructus non apertus. — 7. Id. apertus. — 8 et 9. Folia piloso-stellata. — 10. Pilus radiatus stipitatus.

DRABA GRANDIS. Tab. XLVII.

D. caule ramoso folioso puberulo, foliis puberulis inferioribus ovalibus longè cuneatis grossè dentatis, siliculis ovatis glabris, septo fenestrato. *D. C. l. c.* 2. *p.* 355.

Cochlearia septentrionalis. *D. C. Prod.* v. 1. p. 174 (1).

Crescit in Sibiriæ septentrionalis locis humidis, ad mare glaciale, et in insulâ Sancti-Pauli inter Kamtschatkam et Americam (Langsdorff).

Explic. icon. XLVII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx. — 3. Genitalia. — 4. Petalum. — 5. 6. Stamina. — 7. Silicula. — 8. Eadem dehiscens. — 9. Semen naturali magnitudine. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12 Embryo denudatus.

COCHLEARIA PYRENAICA. Tab. XLVIII.

C. officinalis. Lapeyr. *Abr. pyr.* 568.

C. siliculis obovatis subglobosis pedicelli longitudine, foliis radicalibus cordato-reniformibus integris, caulinis paucis ovatis dentatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 365.

Crescit secùs rivulos in summis Pyrenæorum centralium convallibus.

Explic. icon. XLVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Petalum auctum. — 4. Calyx auctus. — 5. Silicula aucta. — 6. Eadem semi-aperta. — 7. Eadem valvis ablatis, dissepimento seminibusque patentibus. — 8. Semen magnitudine naturali. — 9. Id. auctum. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo denudatus.

COCHLEARIA VELUTINA. Tab. XLIX.

C. siliquis ellipsoïdeis pedicello dimidiò brevioribus, foliis pube ramosâ velutinis radicalibus pinnatipartitis, caulinis sagittatis. *D. C. l.* c. 2. *p.* 370.

Crescit in Mesopotamiâ inter Alep et Mossul (Olivier) ⊙.

Explic. icon. XLIX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx auctus cùm pistillo. — 4. Petalum auctum. — 5. Ovarium auctum. — 6. Silicula aucta. — 7. Eadem semi-aperta, dissepimento seminibusque patentibus.

COCHLEARIA SAXIFRAGÆFOLIA. Tab. L.

C. siliculis ovato-oblongis, foliis glabris, radicalibus petiolatis reniformibus palmatìm inciso-dentatis, caulinis ovatis trilobis, summis linearibus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 370.

Crescit in Persiâ ad montem Elwind (Olivier) ♃.

Explic. icon. L. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx auctus cùm pistillo. — 4. Stamen auctum. — 5. Silicula aucta.

(1) Ad Cochleariæ genus, ut jam in Syst. nat. suspicatus erat auctor, hæc species certò referenda ex Cl. Andrzejowski.

THLASPI LATIFOLIUM. Tab. LI.

T. LATIFOLIUM. MARSH.-BIEB. *Fl. cauc.* 2. p. 99.

T. foliis radicalibus longè petiolatis cordatis repando-dentatis, caulinis ovato-cordatis breviter petiolatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 374.

OBS. Ex Cl. Andrsejowski observatione, septum siliculæ in hâc specie duplex evadit, undè forsan non leviter confirmatur doctrina, circà septi indolem, exposita in Dissert. de Cruciferis, in Mem. Mus. 7. p. 169.

CRESCIT in Iberiæ sylvis (Bieb.), ad Caucasum septentrionalem (Fischer) ♃.

EXPLIC. ICON. LI. — 1. Calyx auctus. — 2. Petalum auctum. — 3. Genitalia aucta. — 4. Stamen auctum. — 5. Silicula aucta. — 6. Eadem aperta. — 7. Eadem longitudinaliter secta. — 8. Eadem seminibus ablatis. — 9. Semen magnitudine naturali. — 10. Semen auctum. — 11. Embryo denudatus.

THLASPI COCHLEARIFORME. Tab. LII.

T. foliis subcarnosulis, radicalibus petiolatis ovatis subdendatis, caulinis cordato-amplexicaulibus, petalis calyce majoribus, siliculis oblongis subemarginatis 8-spermis, stylo brevi filiformi. *D. C. l. c.* 2. *p.* 381.

CRESCIT in Sibiriâ et Dahuriâ (Patrin) ♃.

EXPLIC. ICON. LII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx cùm genitalibus — 3. 4. Petala — 5. Pistillus. — 6. Silicula. — 7. Eadem transversim secta. — 8. Eadem dehiscens. — 9. Semen auctum. — 10. Id transversim sectum. — 11. Embryo denudatus.

HUTCHINSIA TRINERVIA. Tab. LIII.

H. foliis integerrimis trinerviis ovali-oblongis sessilibus basi subcordato-amplexicaulibus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 387.

CRESCIT in Persiæ monte Elwind (Michaux, Olivier) ♃

EXPLIC. ICON. LIII. — 1. Folium caulinarum — 2. Flos auctus — 3. Calyx auctus cum genitalibus. — 4. Genitalia aucta — 5. Petalum auctum — 6. Stamen auctum intùs visum. — 7. Id. extùs visum.

IBERIS CONFERTA Tab. LIV.

I. CONFERTA. *Lagasca varied.* 22 *n.* 22. 1805.

I. caule suffrutescente humillimo, foliis subradicalibus confertissimis sublinearibus acutis glabris, scapo racemifero nudo. *D. C. l. c.* 2. *p.* 398.

Crescit in montibus Hispaniæ (Lag.) ♃.

Explic. icon. LIV. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus. — 3. Genitalia aucta. — 4. Stamen auctum. — 5. Silicula aucta. — 6. Eadem aperta, valvis separatis, dissepimento seminibusque patentibus. — 7. Semen auctum. — 8. Id. transversim sectum. — 9. Embryo denudatus.

BISCUTELLA ERIGERIFOLIA. Tab. LV.

B. erigerifolia. D. C. *Diss. n.* 8.

B. calycibus obtuse bicalcaratis, siliculis glabris lævibus in stylum apice subcoeuntibus. *D. C. Syst.* 2. *p.* 408.

B. auriculata. Dufour *in Ann. gen. sc. nat. p.* 298.

Crescit inter segetes in Hispania ⊙.

Explic. icon. LV. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus cum pistillo. — 3. Pistillum et stamen auctum intus visum. — 4. Id. extus visum. — 5. Petalum auctum. — 6. Silicula aucta. — 7. Semen magnitudine naturali. — 8. Id. auctum.

MENONVILLEA LINEARIS. Tab. LVI.

Menonvillea linearis. *D. C. l. c.* 2. *p.* [illegible].

Crescit in Peruvia (Dombey), in Chili (Ruiz et Pavon).

Explic. icon. LVI. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Calyx cum genitalibus. — 4. Stamen. — 5. Petalum. — 6. Silicula. — 7. Eadem dehiscens. — 8. Eadem transversim secta. — 9. Semen naturali magnitudine. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus.

CAKILE ÆQUALIS. Tab. LVII.

C. siliculæ articulo superiore basi subtetragono apice longe rostrato. *D. C. l. c.* 2. *p.* 430.

Crescit in Martinica (L. C. Richard.) ⊙.

Explic. icon. LVII. — 1. Petalum auctum. — 2. Calyx auctus cum genitalibus. — 3. Stamen auctum intus visum. — 4. Id. extus visum. — 5. Ovarium auctum. — 6. Silicula. — 7. Ead. aucta, longitudinaliter secta. — 8. Ead. transversim secta. — 9. Semen magnitudine naturali. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus. — 13. Folium caulinarium.

CHORISPORA IBERICA. Tab. LVIII.

C. siliquis hirtis vix stylo longioribus, foliis linearibus runcinato-dentatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 437.

CRESCIT in Iberiæ lapidosis (Steven) ⊙.

EXPLIC. ICON. LVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus. — 3. Petalum auctum. — 4. Genitalia aucta. — 5. Ovarium cum glandulis basilaribus. — 6. Stamen auctum.

N. B. In titulo iconis LVIII lege Chorisporam IBERICAM nec C. Sibiricam.

MALCOMIA INCRASSATA. Tab. LIX.

M. caule multiplici subdiffuso, foliis ovalibus petiolatis, superioribus oblongis, pube adpressâ bipartitâ, pedicellis calyce brevioribus post anthesin incrassatis, siliquis pubescentibus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 441.

CRESCIT in insulis Scio et Tenedos (Olivier) ⊙.

EXPLIC. ICON. LIX. — 1. Flos. — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4. Calyx cum genitalibus. — 5-6. Stamen auctum.

MALCOMIA BROUSSONETII. Tab. LX.

CHEIRANTHUS TRILOBUS. L. *Sp.* 925?

M. caule erecto ramoso, foliis oblongis obtusis sinuatis, pube stellatâ tomentoso-canis, pedicellis calyce brevioribus, siliquis pubescentibus, torulosis stylo longo terminatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 445.

CRESCIT in agro Mogadoriensi (Broussonet) ⊙.

EXPLIC. ICON. LX. — 1. Calyx genitalia includens. — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4. Stamen auctum. — 5. Pilus radiatus auctus.

HESPERIS ALYSSIFOLIA. Tab. LXI.

H. pedicellis villosis calyce villosissimo vix longioribus, petalorum laminis oblongis undulatis, foliis oblongis integerrimis pube stellatâ velutinis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 447.

CRESCIT in Persiâ (Michaux).

EXPLIC. ICON. LXI. — 1. Pilus radiatus. — 2. Flos auctus. — 3. Petalum. — 4. Genitalia.

HESPERIS APRICA. Tab. LXII.

H. APRICA. POIRET. *Suppl.* 3. *p.* 194.

H. pedicellis glanduloso-pilosis calycis longitudine, petalorum laminis obovatis, foliis oblongis obtusis cauleque simplici ciliato-hispidis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 452.

CRESCIT in campis apricis Sibiriæ et Dahuriæ ♃.

EXPLIC. ICON. LXII. — 1, 2. Folia. — 3. Calyx cum genitalibus. — 4. Genitalia. — 5. Petalum. — 6. Stamen anticè visum. — 7. Id posticè. — 8. Siliqua dehiscens. — 9. Semen auctum.

SISYMBRIUM EXACOIDES. Tab. LXIII. f. A.

S. foliis ovali-oblongis subintegris glabris glaucis, racemis 1-4 floris, *D. C. l. c.* 2. *p.* 463.

CRESCIT in Libano, loco dicto *Zaali* (Labill.) ☉.

EXPLIC. ICON. LXIII. f. A. Planta naturali magnitudine. — 1. Flos auctus. — 2. Petalum. — 3. Genitalia. — 4. Siliqua. — 5. Semen auctum. — 6. Id. transversim sectum. — 7. Embryo denudatus.

SISYMBRIUM CONTORTUPLICATUM. Tab. LXIII. f. B.

CHEIRANTHUS CONTORTUPLICATUS. STEPH. *in* WILLD.

S. foliis oblongis, radicalibus pinnatifidis, caulinis dentatis aut integris, pedicellis calycis longitudine, siliquis hispidis sæpiùs contortuplicatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 483.

CRESCIT in deserto Cumano (Bieb. Stev.) ☉.

EXPLIC. ICON. LXIII. f. B. Planta naturali magnitudine. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx id. — 3. Genitalia. — 4. Petalum. — 5-6. Siliquæ. — 7. Siliquæ apertæ fragmentum. — 8. Semen naturali magnitudine. — 9. Id. auctum. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo denudatus. — 12. Pilus radiatus.

SISYMBRIUM LYRATUM. Tab. LXIV.

S. LYRATUM. BURM. *Fl. cap.* 17.

S. foliis inferioribus pilosis lyrato-runcinatis lobis dentatis, superioribus oblongis glabris dentatis, siliquis subpatulis glabris. *D. C. l. c.* 2. *p.* 471.

CRESCIT ad Caput Bonæ-Spei (Burm.) ♃.

EXPLIC. ICON. LXIV. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4. Calyx. — 5. Semen naturali magnitudine. — 6. Id. auctum. — 7. Embryo denudatus.

ERYSIMUM SILICULOSUM. Tab. LXV.

CHEIRANTHUS SILICULOSUS. BIEB. *Fl. cauc.* 2. *p.* 121.

E. siliquis stylo brevioribus junioribus calyce persistente tectis, floribus breviter pedicellatis, foliis linearibus integris. *D. C. l. c.* 2. *p.* 491.

Crescit in arenâ mobili deserti Cumani Tauriæ (Bieb.), circà Astracan (Stev.).

Explic. icon. LXV. — 1. Calyx auctus non apertus. — 2. Petalum auctum. — 3. Calyx auctus. — 4. Stamen auctum anticè visum. — 5. Id. posticè visum. — 7. Genitalia aucta. — 8. Ovarium auctum, cùm stylo et stigmate. — 9. Id. transversim sectum, seminibus patentibus.

ERYSIMUM AUREUM. Tab. LXVI.

E. aureum. Marsch. Bieb. *Fl. cauc.* 2. *p.* 117.

E. foliis lanceolatis acuminatis dentatis pubescentibus viridibus, ramis siliquisque patentibus, stigmate crasso bilobo subpedicellato. *D. C. l.* c. 2. *p.* 498.

Crescit in dumetis Caucasi (Bieb.) ⊙.

Explic. icon. LXVI. — 1. Fragmentum caulis, foliumque caulinarium. — 2. Pilus stellato-tripartitus auctus. — 3. Genitalia aucta. — 4. Flos paululùm auctus. — 5. Calyx auctus cùm pistillo. — 6. Petalum auctum. — 7. Siliqua.

ERYSIMUM RIGIDUM. Tab. LXVII.

E. foliis lineari-lanceolatis acutè dentatis, siliquis patulis glabris rigidis, stylo vix ullo. *D. C. l.* c. 2. *p.* 505.

Crescit in Oriente (Labill.).

Explic. icon. LXVII. — 1. Siliqua. — 2. Eadem transversim secta. — 3. Semen naturali magnitudine. — 4. Id. auctum. — 5. Id. transversim sectum. — 6. Embryo denudatus.

LEPTALEUM PYGMÆUM. Tab. LXVIII.

L. foliis ferè omnibus pinnatipartitis, caule siliquis glabris submuricatis breviore. *D. C. l.* c. 2. *p.* 511.

Crescit in Persiâ (Michaux) ⊙.

Explic. icon. LXVIII. — 1. Folium auctum. — 2. Flos auctus. — 3. Calyx auctus. — 4. Petalum auctum. — 5. Genitalia aucta. — 6. Siliqua aucta. — 7. Ead. aperta, seminibus patentibus. — 8. Semen auctum.

CAMELINA MICROCARPA. Tab. LXIX.

C. microcarpa. Andrz. *Crucif. ined.*

C. siliculis pyriformibus bicostatis stylo longiusculo superatis, foliis lanceolatis denticulatis hispidis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 517.

Crescit in Podoliâ ⊙.

Explic. icon. LXIX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Calyx. — 4. Petalum. — 5-6. Stamen. — 7. Silicula. — 8. Eadem aperta. — 9. Semen naturali magnitudine. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus.

CAMELINA BARBAREÆFOLIA. Tab. LXX.

C. siliculis globosis, foliis oblongis pinnatifidis basi obtusè auriculatis, caule basi villoso. *D. C. l. c. 2, p.* 517.

Crescit in Sibiriæ orientalis provinciâ Ircutianâ propè Dorognsk. (Wlassow) ♃.

Explic. icon. LXX. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx. — 3. Stamen. — 4. Pistillus. — 5-6. Siliculæ. — 7. Semina naturali magnitudine. — 8. Semen auctum.

SENEBIERA SERRATA. Tab. LXXI.

S. serrata. Poiret *Dict. 7. p.* 761.

S. foliis oblongis inciso-serratis, siliculis compressis rugosis. *D. C. l. c. 2. p.* 526.

Crescit in Montevideo Brasiliæ (Commerson).

Explic. icon. LXXI. — 1. Flos auctus. — 2. Silicula. — 3. Eadem longitudinaliter secta. — 4. Eadem transversim secta. — 5. Semen auctum. — 6. Embryo denudatus.

LEPIDIUM SPINESCENS. Tab. LXXII.

L. siliculis ovalibus subalatis emarginatis foliis apice incisis, racemorum rachibus apice spinescentibus. *D. C. l. c. 2. p.* 534.

Crescit in Syriâ circà Damascum (Labillard.).

Explic. icon. LXXII. — 1. Silicula. — 2. Eadem dehiscens. — 3. Semen. — 4. Id. transversim sectum. — 5. Embryo denudatus.

LEPIDIUM AFRICANUM. Tab. LXXIII.

Thlaspi africanum. Burm. *Prodr. fl. cap. p.* 17.

L. siliculis ellipticis stigmate sessili apiculatis, foliis radicalibus lyrato-pinnatisectis, lobis lanceis, terminali maximo, mediis pinnatisectis incisisve, summis integris. *D. C. l. c. 2. p.* 552.

Crescit ad Caput Bonæ-Spei ♃.

Explic. icon. LXXIII. — 1. Flos auctus. — 2. Stamen. — 3. Silicula. — 4. Eadem dehiscens. — 5. Semen naturali magnitudine. — 6. Id. auctum. — 7. Id. transversim sectum. — Embryo.

ÆTHIONEMA CRISTATUM. Tab. LXXIV.

Thlaspi peregrinum. Poiret. *Dict.* 7. *p.* 541?

Æ. siliculis bilocularibus 2-4-spermis orbiculatis basi et apice emarginatis, valvulis dorso alatis grosse cristato-dentatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 560.

Crescit in Syria, Persia ☉.

Explic. icon. LXXIV. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus cum genitalibus. — 3. Ovarium auctum. — 4. Silicula aucta. — 5. Ead. aperta, dissepimento seminibusque patentibus. — 6. Ead. transversim secta. — 7. Dissepimentum auctum. — 8. Semen magnitudine naturali. — 9. Id. auctum lateraliter visum. — 10. Id. auctum facie anteriore visum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus lateraliter visus. — 13. Id. facie anteriore visus, radicula dorsali conspicua.

ÆTHIONEMA MEMBRANACEUM. Tab. LXXV.

Lepia membranacea. Desv. *Journ.* 3. *p.* 166? et affin.

Æ. siliculis bilocularibus 2-spermis obcordatis confertis, valvulis dorso alatis integris, foliis linearibus distantibus stricte adpressis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 561.

Crescit in Persiæ monte Elwind (Michaux.) ♃.

Explic. icon. LXXV. — 1. Pistillus. — 2. Silicula. — 3. Eadem dehiscens.

ÆTHIONEMA CORIDIFOLIUM. Tab. LXXVI.

Æ. siliculis bilocularibus 2-spermis obcordatis confertis, valvulis dorso alatis integris, foliis linearibus confertis, inferioribus patulis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 561.

Crescit in monte Libano (Labill.) ♃.

Explic. icon. LXXVI. — 1. Fragmentum caulinarium cum foliis. — 2. Flos auctus. — 3. Calyx auctus cum staminibus. — 4. Genitalia aucta. — 5. Petalum auctum. — 6. Stamen auctum intus visum, filamento dilatato et appendiculato. — 7. Silicula aucta. — 8. Ead. aperta, seminibus patentibus. — 9. Ead. transversim secta. — 10. Semen auctum.

ISATIS GARCINI. Tab. LXXVII.

Peltaria Garcini. Burm. *Fl. ind.* 139. *t.* 46. *f.* 1.

I. siliculis late marginatis obovatis basi cuneatis, subpedicellatis apice obtusissimis bituberculatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 565.

Crescit in Persia (Garcin.).

ISATIS LITTORALIS. Tab. LXXVIII.

I. siliculis oblongo-cuneatis obtusissimis truncato-emarginatis, basi attenuatis glaberrimis latitudine majore triplò longioribus, loculis utrinque exsertis et sulco ab alis distinctis, *D. C. l. c. 2. p. 568.*

Crescit in Tauriæ littoribus circa Sudak (Steven).

Explic. icon. LXXVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Petalum auctum. — 4. Stamen auctum intùs visum. — 5. Id: extùs visum. — 6. Fructus auctus apertus. — 7. Id. transversim sectus. — 8. Semen magnitudine naturali. — 9. Semen auctum. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo denudatus.

ISATIS HEBECARPA. Tab. LXXIX.

I. siliculis oblongo-cuneatis obtusissimis velutinis basi sub-attenuatis latitudine vix ultrà duplò longioribus, loculis sulco laterali destitutis, *D. C. l. c. 2. p. 569.*

Crescit in Tauriæ littoribus circa Sudak (Steven).

Explic. icon. LXXIX. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus. — 3. Genitalia aucta. — 4. Petalum auctum. — 5. Stamen intùs visum. — 6. Id. extùs visum. — 7. Fructus. — 8. Id. transversim sectum. — 9. Id. apertum, semine conspicuo. — 10. Semen auctum. — 11. Embryo denudatus.

SOBOLEWSKIA LITHOPHILA. Tab. LXXX.

S. lithophila. Bieb. *Cent. pl. rar. ross. 2. t. 59. D. C. l. c. 2. p. 575.*

Crescit in Tauriæ rupestribus, passimque in Iberiâ.

Explic. icon. LXXX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Pistillus calyce tectus. — 4. Petalum. — 5. Siliqua.

GOLDBACHIA LÆVIGATA. Tab. LXXXI.

Raphanus lævigatus. Bieb. *Fl. taur. 2. p. 129.*

G. siliquis isthmò biarticulatis lævibus pendulis. *D. C. l. c. 2. p. 577.*

Crescit in arenâ mobili circa Astrakan, rarius in deserto Cumano (Bieb) ⊙.

Explic. icon. LXXXI. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Calyx. — 4. Stamen. — 5. Petalum. — 6. Silicula. — 7. Silicula longitudinaliter secta. — 8. Semen naturali magnitudine. — 9. Id. auctum. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo denudatus.

ANCHONIUM BILLARDIERII. Tab. XXXII.

Anchonium Billardierii. D. C. *l. c.* 2. *p.* 578.

Crescit in Syriæ monte Libano (Labill.) ♃.

Explic. icon. LXXXII. — 1. Folii fragmentum. — 2. Pilus radiatus. — 3. Flos auctus. — 4. Stamina duo majora connata. — 5. Petalum. — 6. Genitalia. — 7. Siliqua. — 8. Eadem longitudinaliter secta. — 9. Semen. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo.

STERIGMA SULFUREUM. Tab. LXXXIII.

Cheiranthus sulfureus. Russel *in* Schrad. *Journ.* 1. *p.* 426.

S. foliis inferioribus runcinato-pinnatifidis, summis integris. *D. C. l. c.* 2. *p.* 580.

Crescit in Syriâ prope Aleppum (Russel et Olivier) ⊙.

Explic. icon. LXXXIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx cum genitalibus. — 3. Petalum. — 4. Stamen. — 5. Stamina duo majora connata. — 6. Genitalia.

STERIGMA ELYCHRYSIFOLIUM. Tab. LXXXIV.

S. foliis omnibus oblongo-linearibus integris. *D. C. l. c.* 2. *p.* 581.

Crescit in Armeniâ (Tournef.), in Persiâ (Gmelin) ♃?

Explic. icon. LXXXIV. — 1. Pilus stellatus auctus. — 2. Flos auctus. — 3. Calyx auctus. — 4. Genitalia aucta. — 5. Petalum auctum. — 6. Stamina aucta, filamentis connatis. — 7. Stamen auctum extus visum. — 8. Ovarium auctum.

BRASSICA MAGELLANICA. Tab. LXXXV.

B. Magellanica. Pers. *Ench.* 2. *p.* 207.

B. herbacea, foliis glabris pectinato-pinnatipartitis, racemis florentibus subcorymbosis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 599.

Crescit ad fretum Magellanicum (Commerson).

Explic. icon. LXXXV. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Petalum auctum.

BRASSICA BALEARICA. Tab. LXXXVI.

B. balearica. Pers. *Ench.* 2. *p.* 206.

B. glabra, foliis inferioribus petiolatis sinuatis subpanduriformibus subcarnosis, caule basi suffruticoso, siliquis rostro quintuplo longioribus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 596.

B. sempervirens. Schrank. Hort. Monac. t. 10.

Crescit in insulis Balearicis (Rich.) ♄.

Explic. icon. LXXXVI. — 1. Siliqua dehiscens.

SINAPIS LEPTOPETALA. Tab. LXXXVII.

S. siliquis glabris patulis, petalis linearibus, foliis pinnatifido-runcinatis in petiolo hispidis, ramis junioribus hispidis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 610.

Crescit ad Caput Bonæ-Spei (Sonnerat.) ♃.

Explic. icon. LXXXVII. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx auctus cùm ovario. — 4. Petalum auctum. — 5. Stamen auctum.

SINAPIS TIMORIANA. Tab. LXXXVIII.

S. siliquis glabris subquadrangularibus torulosis rostro tenui quadruplo longioribus, caule foliisque glabris. *D. C. l. c.* 2. *p.* 616.

Crescit in insulâ Timor.

Explic. icon. LXXXVIII. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus cùm ovario. — 3. Petalum auctum. — 4. Genitalia aucta.

DIPLOTAXIS HISPIDA. Tab. LXXXIX.

Sisymbrium hispidum. *Vahl symb.* 2. *p.* 77.

D. siliquis pendulis sessilibus, foliis obovatis grossè dentatis hispidis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 630.

Crescit in Ægypto (Forsk. Delile), in Syriâ (Labill.) ⊙.

Explic. icon. LXXXIX. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx auctus cùm pistillo. — 4. Petalum auctum. — 5. Siliqua aperta, dissepimento seminibusque patentibus. — 6. Semen magnitudine naturali. — 7. Id. auctum. — 8. Id. transversim sectum. — 9. Embryo denudatus.

DIPLOTAXIS SCAPOSA. Tab. XC.

D. siliquis sessilibus erectis, stylo brevi subfiliformi, foliis radicalibus glabris pinnatifidis, lobis brevibus integris, caulibus nudis brevissimis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 635.

Crescit in insulâ Lampedosâ (Labill.).

Explic. icon. XC. — 1. Flos auctus. — 2. Calyx auctus cùm ovario. — 3. Genitalia aucta. — 4. Ovarium auctum. — 5. Petalum auctum. — 6. Stamen auctum intùs visum.

— 7. Id. extùs visum. — 8. Siliqua aperta, dissepimento seminibusque patentibus. — 9. Semen magnitudine naturali. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus.

CRAMBE ASPERA. Tab. XCI.

C. ASPERA. BIEB. *Fl. taur.* 2. p. 90.

C. filamentis longioribus bifurcis, siliculâ muticâ rugosâ, foliis pinnatipartitis, lobis oblongo-linearibus dentatis, cauleque scabris. *D. C. l. c.* 2. *p.* 654.

CRESCIT in campis Tauriæ (Steven), in deserto Caspico et ad Volgam inferiorem (Bieb.) propè Sareptam (Fischer) ♃.

EXPLIC. ICON. XCI. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia aucta. — 3. Calyx auctus. — 4. Petalum auctum. — 5. Stamen auctum; filamento appendiculato. — 6. Ovarium auctum. — 7. Silicula aucta. — 8. Eadem longitudinaliter secta. — 9. Semen auctum. — 10. Id. transversim sectum. — 11. Embryo denudatus.

DIDESMUS ÆGYPTIUS. Tab. XCII.

D. ÆGYPTIUS. DESV. *Journ.* 3. *p.* 160.

D. foliis inferioribus ellipticis aut pinnatifido-lyratis, summis oblongis subdentatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 658.

CRESCIT in Ægypto (Hasselq.), in insulâ Cypro (Sibth.), in campis Astipaleæ (d'Urville) ⊙.

EXPLIC. ICON. XCII. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Petalum. — 4-5. Stamina. — 6-7. Silicula. — 8. Eadem articulo rupta. — 9. Eadem longitudinaliter secta. — 10. Eadem transversim secta. — 11. Semen naturali magnitudine. — 12. Id. auctum. — 13. Id. transversim sectum.

ENARTHROCARPUS PTEROCARPUS. Tab. XCIII.

RAPHANUS PTEROCARPUS. PERS. *Ench.* 2. *p.* 209.

E. siliquis compressis alâ marginatis longè acuminatis, pedicellis ferè omnibus bracteatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 661.

CRESCIT in Ægypto (Grainger) ⊙.

EXPLIC. ICON. XCIII. — 1. Flos. — 2. Genitalia. — 3. Calyx. — 4. Petalum. — 5. Stamen anticè visum. — 6. Id. posticè. — 7. Siliqua. — 8. Eadem longitudinaliter secta. — 9. Semen naturali magnitudine. — 10. Id. auctum. — 11. Id. transversim sectum. — 12. Embryo denudatus.

RAPHANUS LANDRA. Tab. XCIV.

R. Landra. Moretti. *Fl. insubr. ined.*

R. siliquis unilocularibus articulatis substriatis 2-6-spermis stylo subulato longioribus, foliis interruptè lyratis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 668.

Crescit in Italiâ insubricâ (Moretti).

Explic. icon. XCIV. — 1. Calyx auctus, genitalia nudidens. — 2. Genitalia aucta. — 3. Petalum auctum. — 4. Stamen auctum intùs visum. — 5. Id. extùs visum. — 6. Siliqua. — 7. Eadem longitudinaliter secta. — 8. Semen auctum. — 9. Id. transversim sectum. — 10. Embryo denudatus.

ERUCARIA LATIFOLIA. Tab. XCV.

E. siliquâ styliferâ, foliis pinnatipartitis, lobis oblongis inciso-dentatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 675.

Crescit in Ægypto (Balbis), in Syriâ (P. Russel). ⊙.

Explic. icon. XCV. — 1. Siliqua. — 2. Eadem dehiscens. — 3. Semen naturali magnitudine. — 4. Id. auctum.

HELIOPHILA TENUISILIQUA. Tab. XCVI.

Arabis capensis. Burmann. *Herb.*

H. herbacea, glabra, siliquis tenuissimis compressis submoniliformibus stigmate acuminato terminatis, foliis linearibus integris. *D. C. l. c.* 2. *p.* 680.

Crescit ad Caput-Bonæ-Spei (Burm.). ⊙.

Explic. icon. XCVI. — 1. Flos auctus. — 2. Genitalia. — 3. Calyx cum pistillo. — 4. Petalum. — 5. Siliqua. — 6. Semen naturali magnitudine. — 7. Id. auctum. — 8. Id. transversim sectum. — 9. Embryo denudatus.

HELIOPHILA CRITHMIFOLIA. Tab. XCVII.

H. crithmifolia. Willd. *Enum.* 2. *p.* 682.

H. herbacea velutino-pubescens, siliquis linearibus nutantibus; foliis pinnatipartitis, subcarnosis, lobis subfiliformibus supernè sulcatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 689.

Sisymbrium crithmifolium. Roth. *nov. Sp. p.* 325.

Crescit ad Cap. Bonæ-Spei (Burchell). ⊙.

Explic. icon. XCVII. — 1. Folium caulinarium. — 2. Flos auctus. — 3. Calyx auctus cùm pistillo. — 4. Genitalia aucta. — 5. Petalum auctum. — 6. Siliqua. — 7. Semen magnitudine naturali. — 8. Id. auctum. — 9. Id. transversim sectum. — 10. Embryo denudatus.

HELIOPHILA SCOPARIA. Tab. XCVIII.

Cheiranthus strictus. Poiret. *Suppl.* 2. *p.* 781.

H. fruticosa, glabra, siliquis erectis linearibus in stylum brevem abeuntibus, foliis lineari-subulatis, racemis paucifloris. *D. C. l. c.* 2. *p.* 693.

Crescit ad Cap. Bonæ-Spei. (Burchell.).

Explic. icon. XCVIII. — 1. Calyx auctus clausus. — 2. Flos magnitudine naturali. — 3. Calyx auctus cùm genitalibus. — 4. Petalum magnitudine naturali. — 5. Genitalia aucta. — 6. Siliqua nondùm aperta. — 7. Eadem aperta, dissepimento seminibusque patentibus. — 8. Semen auctum. — 9. Embryo denudatus.

HELIOPHILA CLEOMOIDES. Tab. XCIX.

Cleome capensis. L. *Sp.* 940.

H. siliquis compressis pedicellatis, foliis lineari-lanceolatis. *D. C. l. c.* 2. *p.* 695.

Crescit ad Caput Bonæ-Spei (Linn.), in Monomotapâ (Herb. Burm. apud Deless.).

Explic. icon. XCIX. — 1. Calyx auctus cùm staminibus. — 2. Ovarium auctum. — 3. Petalum auctum. — 4. Stamen auctum intùs visum. — 5. Id. extùs visum.

BRACHYCARPÆA VARIANS. Tab. C.

Heliophila flava. L. *Suppl.* 297.

B. suffruticosa glabra, siliculis subdidymis, foliis oblongo-linearibus. *D. C. l. c.* 2. *p.* 699.

Crescit ad promontorium Bonæ-Spei.

Explic. icon. C. — 1. Flos. — 2. Genitalia. — 3. Calyx. — 4. Stamen. — 5. Petalum. — 6. Silicula calyce vestita. — 7. Silicula. — 8. Eadem longitudinaliter secta. — 9. Eadem transversim secta.

FINIS.

Ex Typis HUZARD-COURCIER, via dicta du Jardinet, n° 12.



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

BERBERIS asiatica*. *(Roxb.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 13.)



Turpin del.t et direx.t *Dion sculp.t*

BERBERIS tinctoria. *(Lesch.)*



Turpin del.t et direx.t — Dien sculp.t

MAHONIA fascicularis. (DC)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 19.)



Turpin del.t et direx.t

Dien sculp.t

MAHONIA Napaulensis. (DC)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 21).



Turpin del.t et direx.t Dien sculp.t

NYMPHÆA reniformis. (Walt.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 55.)



Turpin del.t et direx.t

Dien sculp.t

NUPHAR Japonica. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 62.)



PAPAVER setigerum. *(DC.)*



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

RŒMERIA refracta. (*DC.*)

(*DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 93.*)



Turpin del. et direx. *Bion sculp.*

A. CORYDALIS pauciflora. (*Pers.*) B. DICLYTRA tenuifolia. (*DC.*)

(*DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 115 et 110.*)



Turpin del et direx.t Plée sculp.t

CORYDALIS Marschalliana. (Pers.)


(D.C. Regn. veg. vol. 2. pag. 116.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

MATHIOLA oxyceras. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 173.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

MATHIOLA livida. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 174.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

CHEIRANTHUS leptophyllus. *(Bieb.)*

(DC. Prodr. veg. vol. 2. pag. 182.)



Turpin, del.t et direx.t *Plée sculp.*

NASTURTIUM glaucophyllum. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 197.)



Turpin del. et direx. *Plée sculp.*

NASTURTIUM natans. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 198.)



Turpin del. et direx. Plée sculp.

NOTOCERAS quadricorne. (DC.)

(DC. Regn. vég. vol. 2. pag. 204.)



Turpin del. et direx. *Dien sculp.*

NOTOCERAS Hispanicum, *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 204.)



Turpin del. et direx. *sculp.*

NOTOCERAS cardaminefolium. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 205.)



BARBAREA plantaginea. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 208.)



Turpin del.t et direx.t

STEVENIA alyssoides. (Ad.)

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 209)



STEVENIA cheiranthoides. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 210.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

BRAYA Alpina. *(Sternb. et Hop.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 22.)



Turpin del. et direx. *Dien sculp.*

ARABIS rosea. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 216.)



Turpin del. et direx. Dien sculp.

ARABIS Billardierii. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 218.)



Turpin, del.t et direx.t *Plée sculp.t*

ARABIS longifolia. *(DC.)*

(DC. Regn. Veg. vol. 2. pag. 219.)



Turpin pinx.t et direx.t *M.e Rebel sculp.t*

ARABIS Cebennensis. *DC.*

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 234.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

ARABIS Patriniana. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2, pag. 236.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.*

ARABIS Canadensis. *(Lin.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 238.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

CARDAMINE tuberosa. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 254.)



Turpin del.t et direx.t *Bahel sculp.t*

A. CARDAMINE hederacea. *(DC.)* B. CARDAMINE petiolaris. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 264.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

CARDAMINE glauca. (Spr.)
(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 266.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

CARDAMINE maritima. *(Port.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 266.)



Turpin del.t et direx.t *Plee sculp.t*

DENTARIA quinquefolia. *(Bieb.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 277.)



Turpin del. et direx. *Bion sculp.*

FARSETIA eriocarpa. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 288.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

VESICARIA vestita. *(Desv.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 297)



Turpin del.t et direx.t Plee sculp.

SCHIWERECKIA Podolica. (Bess.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 300.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

ALYSSUM spathulatum. *(Steph. in Willd.)*

(D.C. Regn. veg. vol. 2. pag. 304.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

ALYSSUM obtusifolium. (*Stev.*)

(*DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 305.*)



Turpin del.t et direx.t *Duru sculp.t*

ALYSSUM micropetalum. *(Fisch.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 515.)



Turpin del.t et direx.t

ALYSSUM hirsutum.



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

ALYSSUM macrocarpum. (DC)

(DC Regn. veg. vol. 2. pag. 312)



Turpin del. et direx. *Dien sculp.*

MENIOCUS linifolius *(DC.)*

(DC. Regni veg. syst. 2. pag. 325)



PELTARIA glastifolia. *(DC.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 330.)



Turpin del. et direx. *Plée sculp.*

DRABA incompta. *(Stev.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 340.)



DRABA mollissima (Stev.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

A. **DRABA** lævipes. *(DC.)* B. **DRABA** stellata. *(Jacq.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 346.)



Turpin del. et direx. Plée sculp.

DRABA grandis. (Langsd.)
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 355.)



Turpin pinx.t et direx.t *Dien sculp.t*

COCHLEARIA Pyrenaica. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 365.)



Turpin del. et direx. *Dien sculp.*

COCHLEARIA velutina. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 370.)



Turpin del. Poit. direx. *Plée sculp.*

COCHLEARIA saxifragæfolia. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2, pag. [illegible])



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

THLASPI latifolium. *(Bieb.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2, pag. 374)



Turpin del.t et direx.t *Plee sculp.t*

THLASPI cochleariforme. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 381.)



Turpin del. et direx.

HUTCHINSIA trinervia. (DC.)



IBERIS conferta. *Lag.*



BISCUTELLA erigerifolia. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 408.)



Turpin del.t et direx.t *Plee sculp.t*

MENONVILLEA linearis. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 420.)



Turpin del.t et direx.t

Dion sculp.t

CAKILE æqualis. (L'her.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 430)



CHORISPORA Iberica (*DC.*)

(*DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 237.*)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

MALCOMIA incrassata. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 441.)



Turpin del.t et direx.t

MALCOMIA Broussonetii. *(DC.)*



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

HESPERIS alyssifolia. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 447.)



Turpin pinx.t et direx.t *Dien sculp.t*

HESPERIS aprica. *(Poir.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 452.)



Turpin del. et direx.   Plée sculp.

I. SISYMBRIUM exacoides. (DC.)   II. SISYMBRIUM contortuplicatum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 467 et 483.)



SISYMBRIUM lyratum. *(Burm.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 471.)



Turpin del.t et direx.it Dien sculp.t

ERYSIMUM siliculosum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 491)



Turpin del. et direx. *Plée sculp.*

ERYSIMUM aureum. *(Bieb.)*

[illegible]



Turpin del. et direx. *Plée sculp.*

ERYSIMUM rigidum. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 505.)



Turpin del.t et direx.t

A. LEPTALEUM filifolium. *(DC.)*

B. LEPTALEUM pygmæum. *(DC.)*

(DC. Syst. nat. vol. 2, pag. 511.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

CAMELINA microcarpa. (Andrz.)

(DC. Regn. veg. vol. 2, pag. 517.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

CAMELINA barbaræfolia. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 517.)



Turpin del. et direx. *Dien sculp.*

SENEBIERA serrata. *(Pers.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 526.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

LEPIDIUM spinescens. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. [illegible])



LEPIDIUM Africanum. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 552.)



Turpin del.t et direx.t *Plee sculp.t*

ÆTHIONEMA cristatum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 560.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

ÆTHIONEMA membranaceum. *(DC.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 565.)



Turpin del.^t et direx.^t *Dien sculp.^t*

ÆTHIONEMA coridifolium. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 561.)



Turpin del. et direx. Bion sculp.

ISATIS Garcini. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 565.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

ISATIS littoralis. *(Stev.)*

(DC. Regn. veg. Vol. 2. pag. 568.)



Turpin pinx.t et direx.t *Dien sculp.t*

ISATIS hebecarpa. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 569.)



Turpin del. et direx. *Plée sculp.*

SOBOLEWSKIA lithophila. *(Bieb.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 575.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

GOLDBACHIA lævigata. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 577.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

ANCHONIUN Billardierii. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 578.)



Turpin del.t et direx.t

Dien sculp.t

STERIGMA sulfureum. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 580.)



Turpin del.^t et direx.^t *Plee sculp.^t*

STERIGMA elychrysifolium. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 581.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

BRASSICA Magellanica. *(Pers.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2, pag. 598.)



Turpin del.t et direx.t *Dien sculp.t*

BRASSICA Balearica. *(Pers.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 596.)



Turpin del. et direx. *Plée sculp.*

SINAPIS leptopetala. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. syst. 2. pag. 608.)



Turpin del.t et direx.t *Coignet sculp.t*

SINAPIS Timoriana. *(DC.)*
(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 606.)



Turpin delt. et direxit. Plée sculp.

DIPLOTAXIS hispida. (DC.)

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 630.)



Turpin del. et direx. Plée sculp.

DIPLOTAXIS scaposa. (DC.)
(DC. Regn. veg. vol. 2 pag 635.)



Turpin del.t et direx.t

Dien sculp.t

CRAMBE aspera. (Bieb.)

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 654)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

DIDESMUS Ægyptius *(Desv.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2 pag. 658.)



Turpin del. et direx. *Plée sculp.*

ENARTHROCARPUS pterocarpus. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 661.)



Turpin pinx.t et direx.t *M.elle Coignet sculp.t*

RAPHANUS Landra. *(Mor.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. Pag. 663.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

ERUCARIA latifolia. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 675.)



Turpin del.t et direx.t Plée sculp.t

HELIOPHILA tenuisiliqua. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 680.)



Turpin del. et direx. *Plee sculp.*

HELIOPHILA crithmifolia. *(Willd.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 689.)



Turpin del.t et direx.t *M.e Rebel sculp.t*

HELIOPHILA scoparia. *(Burch.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 693.)



Turpin del.t et direx.t Coignet sculp.

HELIOPHILA cleomoides. (DC.)
(DC. Regn. veg. vol. 2, pag. 695.)



Turpin del.t et direx.t *Plée sculp.t*

BRACHYCARPÆA varians. *(DC.)*

(DC. Regn. veg. vol. 2. pag. 609.)

RLV